



Identification

- Pelage gris brun clair sur les parties dorsales et les flancs, passant progressivement au gris jaunâtre sur le ventre
- Oreilles bien développées dépassant de la fourrure
- Queue parsemée de longs poils fins
- Longueur moyenne tête + corps : 7,65 cm, queue : 3,82 cm
- Poids moyen : 8,5 g (extrêmes : 6 - 13 g)

Ces 2 caractères sont distinctifs des Crocidures

Du fait de son abondance et de son anthropophilie assez marquée, c'est probablement la mieux connue de nos musaraignes. La "Musette" est une musaraigne de taille moyenne, dont la queue, relativement courte, excède à peine la moitié de la longueur tête + corps. La valeur médiane assez forte de l'ensemble tête et corps, fournie dans le cadre d'identification et relevée sur 41 individus provenant du Pays de Bray, est cependant proche de celle (7,38 cm) publiée par Saint Girons (1973) pour un nombre identique d'animaux du département du Pas-de-Calais et cadre assez bien avec l'existence d'une variation clinale de la taille de l'espèce, décroissante du Nord au Sud de la France, signalée par cet auteur.

La Crocidure musette fréquente des biotopes variés : prairies, champs, haies, bois clairs, coteaux calcaires, jardins, ... avec une préférence marquée pour les terrains secs et découverts ; elle pénètre volontiers dans les bâtiments, voire dans les habitations. Bien qu'active jour et nuit, elle serait plus franchement nocturne que les autres espèces. Son régime alimentaire comporte une forte majorité d'invertébrés (insectes, araignées, vers, mollusques, ...) mais elle consomme aussi des éléments végétaux, des petits vertébrés et des détritiques divers. Plusieurs portées comptant de 2 à 6 jeunes sont mises bas durant la période de reproduction qui s'étend de mars à octobre.

Comme les autres musaraignes, la musette est régulièrement consommée par la chouette effraie ; elle l'est beaucoup moins par les autres rapaces, les petits carnivores ou les chats, même s'ils la tuent à l'occasion.

Les bilans d'analyses de pelotes de réjection de chouette effraie laissent supposer que l'abondance de la Crocidure musette en Normandie continentale est très semblable à celle de la Musaraigne couronnée puisqu'elle représente d'un département à l'autre entre 11 et 13% des proies du rapace.

Toute la Normandie continentale : très commune.

