

# Lérot

*Eliomys quercinus*



## Identification

- Physionomie particulière due aux bandes noires qui masquent le museau et entourent l'œil et la base de l'oreille
- Parties supérieures gris brun, ventre blanc
- Longueur tête + corps : 10 à 17 cm ; poids : de 45 à 140 g
- Oreilles plus longues que celles du Loir, queue non touffue



Tout en fréquentant préférentiellement les bois et les vergers, le Lérot, connu localement sous le nom de "Rabaillet", n'est pas strictement arboricole ; il affectionne aussi les terrains rocheux et les éboulis, mais également les constructions humaines. Son gîte d'été peut se situer dans un ancien nid d'Écureuil ou d'oiseau, un trou d'arbre ou de rocher. Il commence à hiberner fin octobre, seul ou avec quelques congénères, dans un nid situé au creux d'un arbre, un nichoir à oiseaux, ou dans une grotte, mais le plus souvent dans les habitations et dépendances. Il s'éveille au début d'avril.

Le régime alimentaire du Lérot est de type omnivore, très variable : fruits en majorité, arthropodes et mollusques terrestres, mais aussi petits mammifères. La prédation sur les nids d'oiseaux est courante. La fréquentation des fruitiers est attestée par de nombreux témoignages, le Lérot étant friand de pommes et de poires. Des cas de consommation d'aliments sucrés dans des résidences secondaires ont été rapportés (confitures, biscuits...), confirmant l'adaptation du Lérot au voisinage de l'homme.

Une seule portée (rarement deux) de 2 à 7 jeunes est mise bas pendant la saison de reproduction qui couvre le printemps et l'été.

Le Lérot vit de 2 à 3 ans.

Bien qu'il soit le plus rencontré des trois Gliridés normands (Lérot, Loir gris et Muscardin), ses mœurs nocturnes ou crépusculaires rendent relativement rare son observation directe.

**Rare à absent en Normandie occidentale, commun en Normandie orientale.**

