


Rat musqué

Ondatra zibethicus



Identification

- Rongeur de grosse taille, massif et trappu
- Longueur tête + corps : 40 cm ; poids : jusqu'à 1,8 kg
- Pieds postérieurs semi-palmés
- Queue aplatie latéralement
- Fourrure épaisse et douce, brune à reflets roux

Espèce introduite en Normandie depuis les années 1920, le Rat musqué est le plus gros Rongeur de la famille des Cricétidés que l'on puisse rencontrer fréquemment dans notre région. Régulièrement confondu avec le Ragondin avec lequel il partage les mêmes biotopes et un mode de vie similaire, il s'en distingue par sa taille plus réduite et la forme de sa queue. L'adaptation à la vie aquatique est marquée par la semi-palmure des pieds postérieurs et par l'aplatissement latéral de la queue longue et quasi glabre. C'est la couleur et l'aspect soyeux de sa fourrure qui ont fait de l'Ondatra un animal d'élevage.

Le Rat musqué vit en bordure des eaux peu profondes, stagnantes ou à cours lent. Il colonise donc les mêmes milieux que le Campagnol amphibie vis-à-vis duquel il exerce une concurrence déséquilibrée tant en ce qui concerne les ressources alimentaires que l'habitat. Ce Rongeur essentiellement végétarien se nourrit de plantes aquatiques, palustres et prairiales, mais il peut aussi consommer des aliments d'origine animale (mollusques et arthropodes) pour pallier des difficultés d'approvisionnement (Triplet, 1983).

Son activité est surtout crépusculaire et nocturne mais il est fréquent d'observer des individus en plein jour. S'il creuse des terriers dans les berges des cours d'eau, il vit aussi dans des huttes faites d'accumulation de roseaux ou d'autres plantes aquatiques dans les étangs et marais. Ces huttes peuvent atteindre plus d'un mètre de haut et deux de large.

La reproduction se déroule généralement de début mars à fin. Les femelles, très prolifiques, peuvent effectuer de 3 à 4 mises bas de 3 à 10 jeunes par an (Hainard, 1987). Des déplacements importants ont lieu en mars au début de la période de reproduction. Ceci se traduit, comme chez le Ragondin, par un nombre élevé d'individus écrasés sur les routes.

Originaire d'Amérique du Nord, le Rat musqué a été introduit en Normandie pour sa fourrure dans les années 1920. C'est suite à l'abandon des centres d'élevages, que des animaux se sont échappés, colonisant par la suite tout le territoire normand.

Le Rat musqué est classé nuisible sur l'ensemble du territoire national.

Toute la Normandie : très commun.



Groupe
Mammalogique
Normand

Extrait de l'ouvrage

GRUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (2004) – Mammifères sauvages de Normandie : statut et répartition. 2^{ème} ed, Groupe Mammalogique Normand, Condé-sur-Noireau, 306 p.