



Identification :

- Longueur des mâles : 2,40 à 3,90 m ; femelles : 2,30 à 3,70 m
- Coloration : gris sombre s'éclaircissant progressivement sur les flancs et sur l'appendice caudal. Face ventrale gris pâle argenté
- Mâchoire inférieure presque blanche jusqu'à son extrémité
- Front convexe surmontant un bec court et large

Avec plus de 700 observations en mer et 50 échouages de 1551 à 2000, le Grand Dauphin regroupe plus de 50% des données normandes de Mammifères marins, toutes espèces confondues. Sa sédentarité, sa répartition partiellement côtière, au moins en été, et son comportement sociable le rendent facilement observable. C'est l'espèce la plus fréquente en Normandie et la plus étudiée depuis que le Groupe Mammalogique Normand a lancé en 1983 ses campagnes d'observation en mer, les "opérations Tursiops".

Rarement solitaire, le Grand Dauphin se déplace le plus souvent en petites bandes de 3 à 7 individus, correspondant vraisemblablement à des groupes familiaux. Des rassemblements plus importants ont lieu dans les grandes zones de pêche où des groupes de 30 à 60 individus (jusqu'à plus d'une centaine observés) ne sont pas rares.

Le régime alimentaire est essentiellement composé de poissons : mullets, orphies, maquereaux, poissons plats, et, plus rarement, de crevettes et de céphalopodes. Un parallèle certain peut être établi entre la présence estivale du maquereau et celle du Grand Dauphin dans le golfe normanno-breton, bien qu'à cette saison il puisse consommer aussi des mullets en fond de baie dans moins de 2 m d'eau. On le rencontre d'ailleurs presque exclusivement sur des fonds de moins de 10 m à cette période de l'année.

Les jeunes mesurent de 0,90 à 1,25 m à la naissance, qui a lieu après une gestation de 12 mois. L'allaitement dure de 12 à 18 mois, ce qui implique qu'une femelle ne peut mettre bas que tous les trois ans. La maturité sexuelle, tardive, serait atteinte entre 5 et 12 ans pour les femelles et 10 ans pour les mâles. Les naissances s'étalent sur toute l'année, mais il semble cependant que les mises bas soient plus fréquentes en début d'été.

Contrairement au Marsouin, le Grand Dauphin ne pénètre pas dans les fleuves au-delà de la limite de salure des eaux. En Normandie, l'espèce effectue des déplacements saisonniers à l'intérieur d'un vaste territoire. En avril, les animaux arrivent dans la frange littorale des côtes continentales où ils séjournent jusqu'en octobre. En novembre, ils quittent ce secteur pour se retrouver jusqu'en mars près des îles et archipels anglo-normands (Chausey, Minquiers, Jersey, Écréhou) et sans doute plus au large.

Présent dans toutes les eaux chaudes et tempérées du monde, le Grand Dauphin dépasse rarement les eaux du Danemark au nord. Bien que rencontré couramment au large, c'est, avec le Marsouin, le plus côtier des petits Cétacés. Il peut s'adapter à tous les milieux littoraux (rocheux, vaseux ou sableux).

Comme tous les Delphinidés, le Grand Dauphin est intégralement protégé dans les eaux territoriales françaises.

Espèce très commune en Manche-Ouest ; commune en Manche-Est.