


Hyperoodon boréal

Hyperoodon ampullatus



Identification :

- Longueur des mâles : 7,30 à 9,80 m
- Longueur des femelles : 5,80 à 8,70 m
- Coloration : Peau gris-noir, plus claire sur le ventre
- Melon globuleux particulièrement développé chez les mâles
- Bec pointu
- Une seule dent de 3 à 4 cm à l'extrémité de chaque demi-mâchoire, bien visible chez les mâles et sortant peu de la gencive chez les femelles

Si la présence d'une dent unique permet de différencier ce gros Dauphin, aussi appelé "Baleine à bec commune", elle indique aussi un régime alimentaire essentiellement composé de céphalopodes.

La reproduction et les mises bas se déroulent au printemps dans les eaux situées en limite des glaces flottantes. À la naissance, qui a lieu après une gestation d'un an, le jeune mesure environ 3,50 m.

L'Hyperoodon boréal est un animal très social et grégaire, qui se déplace en petits groupes de moins de 20 individus. Des concentrations importantes sont toutefois connues sur des sites où la nourriture est abondante.

La répartition mondiale de l'espèce se limite à la partie boréale de l'Atlantique Nord. La France est située à la limite méridionale de son aire habituelle.

C'est en Normandie que les échouages sont les plus fréquents en France (21 cas depuis 1752, 68% des cas français).

L'hyperoodon boréal n'a pas de statut légal en France.

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes.