


Lagénorhynque à bec blanc

Lagenorhynchus albirostris



Identification :

- Longueur des mâles comme des femelles : 2,40 à 3 m
- Dos noir, plages grises et blanches sur les flancs
- Ventre blanc
- Bec blanc à gris

Aussi grégaire que le Lagénorhynque à flancs blancs, le Lagénorhynque à bec blanc se rencontre fréquemment en troupes de plus d'un millier d'individus, bien que la structure sociale la plus commune concerne des bandes de 10 à 30 animaux.

Il se nourrit essentiellement de poissons : merlans, harengs, morues, aiglefin, mais aussi de céphalopodes et de coquillages.

Les naissances ont lieu au milieu de l'été et les mises bas interviennent après une gestation de 10 mois. Le nouveau-né mesure de 1,10 à 1,20 m.

La répartition mondiale de cette espèce est la même que celle du Lagénorhynque à flancs blancs : les eaux froides de l'Atlantique Nord, avec cependant une présence plus proche du pôle en été, et une aire régulière d'hivernage qui descend en Mer du Nord jusqu'à la latitude de Londres.

La première mention en France concerne l'échouage d'une femelle gestante morte sur la côte nord du Cotentin, à Fermanville/50 en 1981.

La Normandie constitue la limite sud de l'aire de répartition du Lagénorhynque à bec blanc.

Cette espèce est intégralement protégée dans les eaux territoriales françaises.

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes.