


Lagénorhynque à flancs blancs

Lagenorhynchus acutus



Identification :

- Longueur des mâles : 2,20 à 2,70 m
- Longueur des femelles : 1,90 à 2,70 m
- Nageoires et dos noirs
- Flancs gris
- Ventre blanc pur
- Deux taches jaune vif à l'arrière des flancs
- Deux bandes blanches le long des flancs à l'arrière de l'aile dorsal

Le Lagénorhynque à flancs blancs est très grégaire. Généralement, il se déplace en petites troupes de quelques dizaines d'individus, dans lesquelles les sexes et les âges sont mélangés. Des rassemblements de plus de 1 000 individus ont déjà été notés pour cette espèce plutôt côtière qui se nourrit essentiellement de poissons (harengs et maquereaux principalement).

L'accouplement a lieu en été et la gestation dure au moins 10 mois. Les jeunes naissent en avril ou en mai. Ils mesurent alors de 1 m à 1,20 m.

En été, le Lagénorhynque à flancs blancs fréquente uniquement les eaux froides de l'Atlantique Nord jusqu'au Groenland et au Spitzberg. Il se montre très rarement l'hiver au sud des côtes hollandaises.

En France, l'espèce n'est connue que depuis mars 1978 par l'échouage d'une femelle dans le Finistère, puis d'un mâle dans le même secteur en avril 1979.

C'est le 18 mars 1982 que le Lagénorhynque à flancs blancs est noté pour la première fois en Normandie lors d'un échouage à Fermanville/50.

Le Lagénorhynque à flancs blancs est intégralement protégé dans les eaux territoriales françaises.

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes.